

MELOXICAM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Meloxicam es un antiinflamatorio no esterooidal del grupo de los oxicamós con acción inhibitoria selectiva sobre la enzima ciclooxigenasa - 2 (COX-2); de esta manera inhibe la síntesis de las prostaglandinas que inducen el proceso inflamatorio respetando la síntesis de las prostaglandinas que desempeñan un papel fisiológico, lo que explica su efectividad terapéutica y su excelente perfil de tolerabilidad, especialmente gastrointestinal y cardiovascular.

COMPOSICIÓN

Comprimidos de 15 mg.

FARMACODINÁMICA

Meloxicam es un antiinflamatorio no esterooidal con acción inhibitoria parcialmente selectiva sobre la enzima ciclooxigenasa - 2 (COX-2); de esta manera inhibe la síntesis de las prostaglandinas que inducen el proceso inflamatorio respetando la síntesis de las prostaglandinas que desempeñan un papel fisiológico, lo que explica su efectividad terapéutica y su excelente perfil de tolerabilidad, especialmente gastrointestinal y cardiovascular.

El meloxicam ha demostrado adecuada efectividad analgésica en situaciones de dolor agudo y crónico. En comparación con AINEs convencionales como el diclofenaco, también ha demostrado un perfil de efectividad, inicio de acción y, sobre todo, tolerabilidad, favorables.

INDICACIONES Y USO

COXICAM está indicado para el tratamiento del dolor agudo y crónico de cualquier etiología, por ejemplo, dolor traumático, dolor postoperatorio, dolor neuromuscular, dolor inflamatorio de diferente etiología, dolor neuromuscular y dolor que acompaña a las exacerbaciones agudas de procesos inflamatorios osteoarticulares crónicos (artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS RECOMENDADAS

Meloxicam oral 15 mg/día.

FARMACOCINÉTICA

La absorción por vía oral es adecuada e independiente de la presencia de alimentos o de la administración de antiácidos. La penetración es adecuada en los tejidos afectados; por ejemplo, en líquido sinovial (el líquido que está en las articulaciones) alcanza una concentración del 50 % de la concentración plasmática. La presencia del fármaco en buenas cantidades en el sitio afectado es necesario para conseguir el efecto analgésico y antiinflamatorio. Tiene una metabolización casi completa en el hígado; se elimina como metabolitos por orina y heces y tiene una vida media de 15 – 20 horas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al meloxicam o a cualquiera de los componentes del producto. Hipersensibilidad a la aspirina o a otros AINEs. Antecedentes de asma, pólipos nasales, angioedema o urticaria que han aparecido después de la administración de AINEs. Úlcera péptica activa, insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal severa (en pacientes que no están recibiendo tratamiento con diálisis). En el postoperatorio de cirugías de bypass coronario.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los antiinflamatorios pueden aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares trombóticos serios como infarto de miocardio y enfermedad cerebrovascular. Los pacientes portadores de enfermedades cardiovasculares o de factores de riesgo cardiovascular pueden tener mayor probabilidad, así como los pacientes que reciben la medicación por un tiempo mayor al recomendado. Otros eventos pueden ser hipertensión arterial, retención de fluidos, edema e insuficiencia cardiaca. La administración a largo plazo de AINEs como meloxicam pueden producir necrosis papilar renal, insuficiencia renal u otro tipo de afectación renal. Los pacientes que tienen mayor riesgo de estas complicaciones son los que tienen una enfermedad renal de base, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, ancianos, pacientes que toman diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor AT1 de angiotensina II.

Embarazo: categoría C. Meloxicam debe ser administrado sólo si el beneficio para la madre supera el riesgo potencial para el feto. No administrar en el tercer trimestre del embarazo. **Lactancia:** debe evaluarse si discontinuar la lactancia o la droga, considerar la importancia de la droga para la madre. **Pediatría:** la seguridad y eficacia del meloxicam no han sido establecidas. **Geriatría:** se recomienda iniciar el tratamiento con las menores dosis posibles.

INTERACCIONES

Si se utiliza Meloxicam junto con otros AINEs hay mayor riesgo de eventos adversos gastrointestinales. El uso de Meloxicam con anticonceptivos hormonales conlleva el riesgo de embarazo. Meloxicam puede disminuir el efecto de los inhibidores ECA, furosemida y diuréticos tiazídicos, elevar el litio plasmático e incrementar el riesgo de sangrado en pacientes con **warfarina o agentes similares**.

EFFECTOS INDESEABLES

Los más frecuentes son rash, dolor abdominal, vómito, náusea, trombocitopenia, leucopenia, elevación de enzimas hepáticas, ansiedad, depresión, somnolencia y fotosensibilidad.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja por 10 comprimidos de 15 mg



Comprimidos recubiertos de
15 mg

